

GALLIMUNE®

CHOLERA

GALLIBACTERIUM
MULTOCIDA

Descripción

Vacuna inactivada, concentrada y emulsionada en aceite para la prevención de las infecciones producidas por la *Gallibacterium multocida* en las aves.

Composición

- *Gallibacterium multocida*, serotipos 1, 3 y 4.
- Excipiente oleoso c.b.p. 0.3 ml.



Aves
reproductoras



Pollas de
reemplazo

Administración y dosis

Se administra por vía subcutánea en la parte media posterior del cuello o por vía intramuscular a razón de 0.3 ml por ave.

En aves comerciales y reproductoras

- Vacunación inicial entre las 3 y 4 semanas de edad.
- Vacunación de refuerzo: de 2 a 4 semanas antes del inicio del período de postura.

Pavos reproductores

- Vacunación inicial entre: 5 y 6 semanas de edad.
- Vacunación de refuerzo entre las 10 y 12 semanas de edad.
- Vacunación de refuerzo entre las 24 y 26 semana de edad.

Pavos comerciales

- Vacunación inicial entre: 5 y 6 semanas de edad.
- Vacunación de refuerzo entre las 10 y 12 semana de edad.
- Vacunación de refuerzo entre las 24 y 26 semanas. de edad.

Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

Presentación

Frascos de 1,000 dosis (300 ml).