

AVINEW[®]

Descripción

Vacuna a virus vivo para la prevención de la Enfermedad de Newcastle en las aves.



POLLOS DE
ENGORDE



AVES
REPRODUCTORAS



POLLAS DE
REEMPLAZO



Composición

- Virus activo de la Enfermedad de Newcastle, cepa VG/GA.
- Originada en cultivo celulares de embrión de pollo Libres de Patógenos Específicos (SPF).

Administración y dosis

Puede ser administrada por métodos masivos o individuales:

Masivos

Aspersión

- Utilice un equipo especialmente diseñado para vacunar, SpraVac[®], SoloVac[®] o UlvaVac[®] (solicite los manuales del equipo según corresponda).
- Utilice agua desmineralizada.
- Siga las instrucciones de uso del equipo.

Água de Bebida

- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.

Individuales

Gota Ocular

- Se requiere de un diluyente de agua tri-destilada en volumen suficiente a razón de 0.03 ml por ave (no incluido con la vacuna).

Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

Presentación

10 Frascos x 1,000 dosis.

10 Frascos x 2,000 dosis.

