

NEMOVAC®

Descripción

Vacuna a virus vivo para la prevención de la Metaneumovirus en las aves.



POLLOS DE
ENGORDE



AVES
REPRODUCTORAS



POLLAS DE
REEMPLAZO



Composición

- Virus activo atenuado de Cabeza Hinchada cepa PL21.
- Originada en cultivo de células VERO.

Administración y dosis

Para ser aplicada por métodos masivos o individuales en la membrana del ala una vez reconstituida con el diluyente a base de glicerina.

Masivos

Aspersión

- Abra y mezcle el contenido del frasco al momento de la vacunación.
- Utilice un equipo especialmente diseñado para vacunar SpraVac®, SoloVac® o UlvaVac® (solicite el manual del equipo).
- Utilice agua desmineralizada.
- Siga las instrucciones de uso del equipo proporcionadas por Boehringer Ingelheim.

Água de Bebida

- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.

Individuales

Gota Ocular

- Se requiere de un diluyente de agua tri-distilada en volumen suficiente a razón de 0.03 ml por ave (no incluido con la vacuna).

Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

Presentación

Frascos 10 x 1,000 dosis / 10 x 5,000 dosis.

Consulte al Médico Veterinario.

Boehringer Ingelheim © 2019

