

# NEWCASTLE- BRONQUITIS INFECCIOSA®

\*B1-Mass-Conn

## Descripción

Vacuna a virus vivo para la prevención de las Enfermedades de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa\* de las aves.



POLLOS DE  
ENGORDE



AVES  
REPRODUCTORAS



POLLAS DE  
REEMPLAZO



## Composición

Virus activo de la Enfermedad de Newcastle, cepa B1 tipo B1.

Virus activo de la Bronquitis Infecciosa cepas tipo Massachusetts y Connecticut.

Originada en cultivo celulares de embrión de pollo Libres de Patógenos Específicos (SPF).

## Administración y dosis

Para ser aplicada por metodos masivos o individuales en la membrana del ala una vez reconstituida con el diluyente a base de glicerina.

### Masivos

#### Aspersión

- Abra y mezcle el contenido del frasco al momento de la vacunación.
- Utilice un equipo especialmente diseñado para vacunar SoloVac® o UlvaVac® (solicite el manual del equipo).
- Utilice agua desmineralizada.
- Siga las instrucciones de uso del equipo proporcionadas por Boehringer Ingelheim.

#### Água de Bebida

- Elimine la administración de medicamentos o desinfectantes en el agua de bebida por lo menos 72 horas antes de la vacunación.

### Individuales

#### Gota Ocular

- Se requiere de un diluyente de agua tri-distilada en volumen suficiente a razón de 0.03 ml por ave (no incluido con la vacuna).

## Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

## Presentación

Frascos 50 x 1,000 dosis / 50 x 2,000 dosis / 25 x 5,000 dosis / 10 x 15,000 dosis.

Consulte al Médico Veterinario.

Boehringer Ingelheim © 2019

