

# PT BLEN®

## Descripción

Vacuna a virus vivo para la prevención de la Encefalomiелitis y la Viruela Aviar en las aves.



POLLOS DE  
ENGORDE



AVES  
REPRODUCTORAS



POLLAS DE  
REEMPLAZO



## Composición

- Virus activo de la Encefalomiелitis Aviar, cepa Calnek.
- Virus activo de Viruela Aviar, cepa Cutter.
- Originada en embrión de pollo Libres de Patógenos Específicos (SPF).

## Administración y dosis

Para ser aplicada por metodos masivos o individuales en la membrana del ala una vez reconstituida con el diluyente a base de glicerina (al menos 4 semanas antes del inicio de la produccion).

### Método Membrana del Ala

- Se requiere de un diluyente de agua tri-destilada con glicerina en volumen suficiente a razón de 0.01 ml por ave y un aplicador especial incluido con la vacuna.
- Una vez reconstituida la vacuna, formando una suspensión homogénea, introduzca el aplicador con la vacuna y puncione la parte inferior de la membrana del ala.
- No puncione a través de las plumas pues se perdería la vacuna.
- El aplicador está diseñado para transportar la cantidad apropiada de vacuna en las ranuras de las agujas.
- Las agujas deben tocar brevemente el cuello del frasco que contiene la vacuna antes de sacarlas para evitar desperdicio, el cual puede ocurrir cuando exceso de vacuna gotee de las agujas.
- Introduzca el aplicador en el frasco que contiene la vacuna antes de cada aplicación.

## Almacenamiento

Mantener en refrigeración de 2 a 7°C, protegida de la luz solar. No congelar.

## Presentación

25 Frascos x 1,000 dosis.

Consulte al Médico Veterinario.

Boehringer Ingelheim © 2019

